

## CARGO DE DENTISTA

### Questão 01

A proposta do Tratamento Restaurador Atraumático foi desenvolvida pelo Dr. Jo E. Frencken e sua equipe em meados dos anos 80. Tem como características:

- A) Paralisar o processo carioso através da aplicação de materiais restauradores temporários e, por este motivo, está indicada exclusivamente para crianças.
- B) A utilização de materiais adesivos à estrutura dentária e a não utilização de anestesia, isolamento absoluto e instrumentos rotatórios.
- C) A indicação apenas para pacientes com pouca colaboração ao tratamento odontológico convencional, como bebês ou pessoas com deficiência mental.
- D) A indicação apenas para lesões cáries restritas ao terço externo e médio da dentina.

### Questão 02

Abaixo são listadas algumas contraindicações para a realização do tratamento restaurador atraumático, com **exceção** de:

- A) Dor provocada.
- B) Fístula.
- C) Radiolucidez na região interradicular.
- D) Reabsorções interna ou externa.

### Questão 03

Em caso de lesão cáries profunda, é aconselhável:

- A) Remover todo o tecido cariado, ainda que isso implique em risco de exposição pulpar e necessidade de tratamento endodôntico.
- B) Aplicar um agente químico para a estabilização do processo carioso e diminuição da sensibilidade dolorosa (como os cariosstáticos) previamente à remoção do processo carioso.
- C) A realização de capeamento pulpar indireto após a remoção de todo o processo carioso e lavagem da cavidade com solução de clorexidina 0,2%.
- D) Remover todo o tecido desmineralizado das paredes circundantes e a remoção da dentina amolecida até que esta comece a ser removida em lascas ou escamas.

### Questão 04

Propostas inovadoras têm sido propostas nos últimos anos para a educação em saúde. Uma delas utiliza problemas extraídos da realidade das pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Esta técnica é denominada:

- A) Aprendizagem baseada em problemas.
- B) Pedagogia Freiriana.
- C) Problematização.
- D) Construtivista.

## CARGO DE DENTISTA

### Questão 05

Em 2005, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou um documento com base em revisão de literatura, em relatos da própria OMS sobre políticas públicas de saúde e em trabalhos científicos sobre promoção de saúde bucal, que propunha o esboço de estratégias de saúde pública com base nos princípios da Carta de Ottawa. Assinale a alternativa que **não** contém uma das recomendações ou constatações da OMS para que estratégias de saúde bucal tenham sucesso.

- A) A Odontologia deve se esforçar para identificar hábitos que sejam fatores de risco comum para o desenvolvimento de várias doenças e atuar sobre eles.
- B) As doenças bucais são altamente preveníveis. Portanto, devemos tornar as pessoas aptas a manter sua saúde através do conhecimento de que a saúde bucal é parte da saúde geral.
- C) As políticas públicas devem levar em consideração os determinantes sociais da saúde, ou seja, o ambiente em que a população está inserida, seus hábitos culturais, suas condições de vida devem ser considerados no planejamento de ações de saúde.
- D) É necessário que a Odontologia não disperse sua atenção da saúde bucal, se envolvendo em grupos em que a atuação de outros profissionais será mais efetiva, como os grupos antitabagismo.

### Questão 06

Sobre a suplementação de flúor durante a gestação, assinale V para verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- ( ) Quando a gestante ingere água fluoretada, a suplementação pré-natal está contra-indicada.
- ( ) Nenhum estudo comprovou a eficácia da ingestão de flúor durante a gravidez na diminuição da incidência de cárie em dentes decíduos.
- ( ) Embora o Ministério da Saúde do Brasil não recomende a prescrição de flúor no pré-natal, em outros países do mundo esta recomendação é feita por organizações de reconhecido renome científico.

- A) V – V – V
- B) V – F – V
- C) F – V – F
- D) V – V – F

### Questão 07

Sobre a utilização de gel de flúor para o controle da cárie, assinale a alternativa correta.

- A) Embora a recomendação de não beber água ou comer após a aplicação de gel de flúor tenha sido seguida, não há evidência da sua relevância anti-cárie.
- B) A aplicação de gel de flúor só pode ser feita pela utilização de moldeiras ou de cotonetes, sob isolamento relativo.
- C) Mesmo se utilizada na frequência indicada pelo Ministério da Saúde, há risco de fluorose dentária.
- D) Para a aplicação de gel fluoretado, a profilaxia prévia é relevante.

### Questão 08

Dentes supranumerários ou hiperdontia podem ocorrer na dentição decídua ou na permanente. Assinale a alternativa correta a respeito da hiperdontia.

- A) A melhor forma de localizar um supranumerário é por meio da tomada de duas radiografias periapicais ou oclusais com a técnica de paralax.
- B) Dentes supranumerários ocorrem com aproximadamente a mesma frequência na maxila e na mandíbula.

## CARGO DE DENTISTA

- C) Um decíduo supranumerário é sempre seguido por um supranumerário permanente.
- D) A hiperdontia é cerca de cinco vezes mais comum na dentição decídua.

### Questão 09

Após a remoção de um dente supranumerário da dentição decídua, o acompanhamento clínico e radiográfico está indicado visando a determinação de se o dente permanente está erupcionando normalmente. Está indicada a exposição cirúrgica e o tracionamento ortodôntico quando não for observado movimento eruptivo dentro de um prazo de:

- A) 30 dias.
- B) 2 a 3 meses.
- C) 6 a 12 meses.
- D) Mais do que 12 meses.

### Questão 10

Os fármacos de uso odontológico, como os anestésicos locais, os analgésicos, os anti-inflamatórios, os sedativos e os antibióticos passam com certa facilidade pela barreira placentária. Dentre os fármacos listados abaixo, o fármaco considerado como categoria C, ou seja, os resultados de estudos em animais revelaram efeitos adversos no feto, mas não existem estudos controlados em mulheres, é:

- A) A prilocaína.
- B) A dipirona.
- C) A amoxicilina.
- D) O paracetamol.

### Questão 11

Se uma gestante procura atendimento odontológico de urgência com histórico de hipertensão não controlada e história de anemia, o anestésico melhor indicado é a:

- A) Prilocaína 3% com felipressina.
- B) Mepivacaína 3% sem vasoconstrictor.
- C) Lidocaína 2% com adrenalina 1 : 100.000.
- D) Lidocaína 2% com adrenalina 1 : 200.000.

### Questão 12

Em pacientes com doença cardiovascular controlada, o volume máximo de tubetes de lidocaína 2% com adrenalina 1 : 100.000 por sessão de atendimento é:

- A) 1/2 tubete.
- B) 1 tubete.
- C) 2 tubetes.
- D) 4 tubetes.

## CARGO DE DENTISTA

### Questão 13

Para a realização de profilaxia antibiótica em pacientes com histórico de endocardite bacteriana e sem histórico de alergias, a primeira opção é:

- Aazitromicina.
- A) Clindamicina.
- B) Amoxicilina.
- C) Metronidazol.

### Questão 14

Para a prescrição de benzodiazepínicos, deve-se utilizar:

- A) O receituário comumente utilizado para a prescrição das drogas usualmente utilizadas em Odontologia.
- B) A notificação de receita A (amarela).
- C) A notificação de receita B (azul).
- D) A notificação de receita especial (de cor branca).

### Questão 15

Cada vez mais estão sendo utilizadas resinas compostas e um dos passos importantes que vem permitindo sua utilização mais ampla foi o aprimoramento no método utilizado para a polimerização. Fotopolimerizadores de luz halógena são os mais utilizados. Eles são aparelhos capazes de gerar e transmitir com alta intensidade luz azul, que idealmente deve ter seu comprimento de onda oscilando entre:

- A) 120 e 220 nanômetros.
- B) 150 e 240 nanômetros.
- C) 240 e 360 nanômetros.
- D) 400 e 550 nanômetros.

### Questão 16

Traumas são uma ocorrência comum na infância e uma das sequelas frequentemente observadas é a calcificação progressiva do canal radicular. Quando isto ocorre o dente fica com coloração:

- A) Amarelada e o tratamento indicado é a pulpectomia.
- B) Amarelada e não há necessidade de intervir, pois geralmente ocorrerá reabsorção radicular normal.
- C) Acinzentada e o tratamento indicado é a pulpectomia.
- D) Acinzentada e não há necessidade de intervir, pois geralmente ocorrerá reabsorção radicular normal.

### Questão 17

Após traumatismo em dentes decíduos, várias sequelas podem ser observadas. Uma delas é a coloração rósea da coroa, que é um indicativo de:

- A) Reabsorção interna.
- B) Reabsorção externa.
- C) Necrose pulpar.
- D) Hiperemia.

## CARGO DE DENTISTA

### Questão 18

Se uma criança for trazida para tratamento odontológico de urgência e seus responsáveis legais não estiverem presentes, deve-se:

- A) Realizar o tratamento necessário já que em casos de urgência o tratamento pode ser realizado mesmo sem a autorização prévia dos pais ou responsável pela criança.
- B) Ligar para os responsáveis legais e exigir seu comparecimento para assinar a autorização para o atendimento da criança.
- C) Somente prescrever medicação para dor e solicitar para que os responsáveis compareçam posteriormente para que o tratamento possa ser efetivamente realizado.
- D) Pedir autorização para a chefia imediata para a realização do tratamento da criança.

### Questão 19

O periodonto compreende os seguintes tecidos: gengiva, ligamento periodontal, cimento radicular e o osso alveolar. Sua principal função é inserir o dente no tecido ósseo dos maxilares e manter a integridade da superfície a mucosa mastigatória da cavidade bucal. São características da gengiva sadia a coloração:

- A) rósea, superfície brilhante e consistência firme.
- B) rósea, superfície opaca e consistência firme.
- C) avermelhada, superfície brilhante e consistência firme.
- D) avermelhada, superfície opaca e consistência firme.

### Questão 20

Sobre a periodontite, assinale a alternativa correta.

- A) Pacientes que não apresentem a gengiva com aspecto pontilhado de casca de laranja estão com periodontite.
- B) Caso não alterem seus hábitos, todo paciente com gengivite evoluirá para a periodontite.
- C) Quando a periodontite se instala, há predominância de microrganismos aeróbios.
- D) Quando a periodontite se instala, há predominância de microrganismos anaeróbios.

### Questão 21

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) constitui um instrumento a todos os cidadãos que venham a se engajar na política de promoção, proteção e defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Considera-se criança a pessoa até os:

- A) Doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
- B) Treze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre treze e dezoito anos de idade.
- C) Treze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre treze e vinte e um anos de idade.
- D) Doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e vinte e um anos de idade.

## CARGO DE DENTISTA

### Questão 22

Em relação à Política de Atendimento, disposta no ECA, assinale V para verdadeiro e F para falso e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- ( ) A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.
- ( ) Uma das diretrizes da política de atendimento diz respeito à centralização do atendimento a nível nacional, impedindo que conselhos municipais interfiram no processo das ações de guarda de crianças e adolescentes.
- ( ) Dentre as linhas de ação da política de atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, estão campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.

- A) V – V – V  
B) V – F – V  
C) F – V – F  
D) F – F – F

### Questão 23

De acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Goioerê, o cargo de dentista pertence ao grupo Ocupacional:

- A) Básico.  
B) Médio.  
C) Profissional.  
D) Especial.

### Questão 24

Ainda de acordo com o Estatuto do Servidor Municipal de Goioerê, progressão funcional é a passagem do servidor estável, de um nível para outro, dentro do mesmo cargo efetivo e tabela de vencimento em que se encontrar enquadrado, sendo apurada a cada interstício de:

- A) Seis meses de efetivo exercício.  
B) Um ano de efetivo exercício.  
C) Dois anos de efetivo exercício.  
D) Cinco anos de efetivo exercício.

### Questão 25

Alguns pacientes requerem sedação para a realização do tratamento odontológico. Uma das drogas de escolha para a sedação é o midazolam, cuja dose é de:

- A) 0,5 mg.  
B) 7,5 mg.  
C) 50 mg.  
D) 500 mg.

## CARGO DE DENTISTA

### Questão 26

Durante o exercício profissional, o cirurgião-dentista e sua equipe estão expostos à contaminação por vários agentes. Para sua proteção recomenda-se a vacinação sempre que possível e a verificação da resposta imune. Dos microrganismos listados abaixo, é possível realizar a vacinação e a verificação da soroconversão contra o vírus da:

- A) Hepatite B.
- B) Hepatite C.
- C) Hepatite Delta.
- D) Imunodeficiência humana.

### Questão 27

Para a realização de tomadas radiográficas na região anterior de maxila e mandíbula em lactentes, está indicada a técnica:

- A) Randall.
- B) Gow-Gates.
- C) Da bisettriz.
- D) De Mannkopf.

### Questão 28

Em populações com baixa prevalência de cárie, só se justifica o primeiro exame bitewing em crianças aos:

- A) Dois anos de idade.
- B) Três anos de idade.
- C) Quatro anos de idade.
- D) Cinco anos de idade

### Questão 29

Para evitar que crianças causem lesões em tecidos moles devido à persistência da anestesia, está indicada a utilização de um anestésico sem vasoconstritor. O anestésico sem vasoconstritor que provoca anestesia pulpar de até 20 minutos com técnica infiltrativa e que pode ser utilizado em crianças é a:

- A) Lidocaína.
- B) Prilocaína.
- C) Articaína.
- D) Mepivacaína.

### Questão 30

“Dentes de Hutchinson” refere-se a uma anormalidade de desenvolvimento que ocorre em pessoas em decorrência da

- A) Varicela.
- B) Sífilis.
- C) Anemia.
- D) Aids.