

## CARGO DE MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL

### Questão 01

Assinale a alternativa correta:

- A) A presença de interesses estereotipados e de empatia afetiva é característico do transtorno de personalidade esquizóide.
- B) Raramente o transtorno de personalidade histriônica em homens está associado ao abuso de substâncias.
- C) A característica do transtorno de personalidade *borderline* é a presença de afetos disfóricos intensos e a cognição intacta.
- D) O que diferencia o transtorno de personalidade emocionalmente instável do transtorno de personalidade antissocial é a presença de sentimento de culpa após a realização de um ato impulsivo.

### Questão 02

Quantos tipos de transtorno bipolar existem? Assinale a alternativa correta:

- A) 2 tipos.
- B) 3 tipos.
- C) 4 tipos.
- D) 5 tipos.

### Questão 03

Algumas condições físicas podem ser associadas a ansiedade. Tais como:

- A) Menopausa.
- B) Doença do refluxo gastroesofágico.
- C) Hipotireoidismo.
- D) Todas as anteriores são corretas.

### Questão 04

Sobre o transtorno de Pânico é correto afirmar:

- A) É incomum que os pacientes com Transtorno de Pânico tenham grande preocupação com a saúde física.
- B) A ocorrência isolada de um ataque de pânico inesperado define, por si só, o diagnóstico de um Transtorno de Pânico.
- C) A comorbidade com outros transtornos mentais é comum, mais frequentes os diagnósticos de depressão maior, outros transtornos de ansiedade e transtornos por uso de substância psicoativa.
- D) A classe de drogas que têm sido amplamente empregadas no tratamento farmacológico do Transtorno de Pânico são os antidepressivos e os estabilizadores de humor.

## CARGO DE MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL

### Questão 05

Qual recomendação é inadequada para uma mulher com distúrbio bipolar que pretenda engravidar:

- A) Reavaliar o padrão sazonal da doença, para o planejamento da época da concepção.
- B) Fornecer aconselhamento genético, incluindo esclarecimento sobre a hereditariedade da doença.
- C) Discutir, com a paciente e a família, os riscos e benefícios do uso da medicação na gravidez.
- D) Iniciar uso de 0,4 mg/dia de ácido fólico. Se em uso de carbamazepina ou ácido valpróico, reduzir a dose para 0,2mg/dia.

### Questão 06

Faça a correlação entre os fármacos e os efeitos colaterais.

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 1- Lítio.         | A- Hipotensão postural. |
| 2- Clozapina.     | B- Hiperprolactinemia.  |
| 3- Risperidona.   | C- Hipotireoidismo.     |
| 4- Amitriptilina. | D- Miocardite.          |

A correlação correta é:

- A) 1-B; 2-A; 3-D; 4-C.
- B) 1-C; 2-D; 3-B; 4-A.
- C) 1-A; 2-C; 3-D; 4-B.
- D) 1-C; 2-B; 3-A; 4-D.

### Questão 07

Os tipos de distúrbios delirantes são classificados com base no tema delirante predominantemente do tipo:

- A) Minúsculo.
- B) Ciumento.
- C) Erotomaníaco.
- D) Persecutório.

### Questão 08

"A terapia cognitivo-comportamental ajuda a compreender os comportamentos e como conseguir controlá-los." Durante a terapia, e também em casa, o paciente aprenderá a, EXCETO:

- A) Evitar cafeína e drogas ilícitas.
- B) Reconhecer e substituir os pensamentos que causam pânico, diminuindo o sentimento de impotência.
- C) Pensar que as pequenas preocupações se transformarão em problemas mais graves.
- D) Compreender e aprender a controlar as visões distorcidas das supostas fontes de estresse da vida, como o comportamento de outras pessoas ou eventos importantes.

## CARGO DE MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL

### Questão 09

Quanto à Esquizofrenia é correto afirmar:

- A) Os sintomas devem persistir por no mínimo 3 meses para que o diagnóstico seja feito.
- B) A quetiapina faz parte do grupo de antipsicóticos atípicos e pode induzir a catarata quando usada a longo prazo.
- C) O início dos sintomas habitualmente ocorre próximo dos 45 anos.
- D) A clozapina é considerada droga de primeira linha por apresentar, de modo geral, um número menor de efeitos colaterais no sistema hematopoiético do que os outros antipsicóticos.

### Questão 10

O sintoma clássico de *delirium* se apresenta como:

- A) Presença de demência preexistente.
- B) Ausência de distúrbio de consciência.
- C) Presença de flutuação clínica.
- D) Ausência de condição clínica subjacente.

### Questão 11

Uma opção adequada para a terapêutica de neuropatias periféricas e que combina propriedades de inibidores seletivos da captação de serotonina com inibição concomitante da recaptação da norepinefrina é o antidepressivo:

- A) Duloxetina.
- B) Estacilopram.
- C) Fluoxetina.
- D) Bupropiona.

### Questão 12

No tratamento da intoxicação por opiáceos, qual a drogas abaixo é a mais utilizada:

- A) Diazepam.
- B) Clonidina.
- C) Metadona.
- D) Naloxone.

### Questão 13

O quadro clínico de "Alienação Mental", em avaliação pericial, pode ter várias etiologias. Qual das alternativas abaixo normalmente não se caracteriza:

- A) Oligofrenias graves.
- B) Psicoses esquizofrênicas nos estados crônicos.
- C) Transtornos neuróticos.
- D) Demência associada ao Parkinson.

## CARGO DE MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL

### Questão 14

Assinale a alternativa correta em relação aos Transtornos somatiformes:

- A) O aspecto principal dos Transtornos somatoformes é a apresentação repetida de sintomas físicos juntamente com solicitações persistentes de investigações médicas, apesar de repetidos achados negativos e de reassuramento pelos médicos de que os sintomas não tem base física.
- B) A Disfunção autonômica somatoforme refere-se à dor crônica, cuja origem ou cujo grau de intensidade não podem ser explicados por patologia física ou processo fisiológico.
- C) No Transtorno hipocondríaco, o quadro clínico caracteriza-se por múltiplos sintomas recorrentes, mutáveis, envolvendo diversos órgãos e sistemas.
- D) O Transtorno de somatização é observado mais frequentemente em homens, na adolescência ou no início da idade adulta.

### Questão 15

Em um paciente de 30 anos com função renal adequada e sem doenças adicionais, qual seria a concentração sérica de lítio considerada adequada:

- A) 10 mEq/L.
- B) 0,05 mEq/L.
- C) 0,8 mEq/L.
- D) 15 mEq/L.

### Questão 16

Com relação à terapêutica com Bupropiona, qual das alternativas descreve a maior contra-indicação:

- A) Uso de aspirina.
- B) Crises convulsivas.
- C) Neuropatia diabética.
- D) Doença pulmonar obstrutiva crônica.

### Questão 17

Quanto aos pacientes usuários de cocaína e crack, é correto afirmar:

- A) Nos dependentes de crack e cocaína é observada a entre o querer e gostar. O uso não é reconhecido como prejudicial, e permanece uma premência pela continuidade de consumo.
- B) Na primeira etapa da síndrome de abstinência de cocaína há um período de piora do humor, hipersônia, esgotamento físico, sintomas depressivos e arrependimento do uso.
- C) A via oral de administração de cocaína é a via com maior poder de causar dependência.
- D) A capacidade da cocaína de gerar tristeza e mal estar, a partir de qualquer via de administração, reforça e motiva, na maioria dos indivíduos, o desejo por um novo episódio de uso.

## CARGO DE MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL

### Questão 18

Considerando a Diretriz da Associação Brasileira de Psiquiatria, para os "Transtornos de Ansiedade: Diagnóstico e Tratamento", recomendações que encontram sustentação na Medicina baseada em evidências, qual a única classe de medicamentos recomendados para o tratamento do Transtorno Obsessivo-compulsivo com eficácia comprovada por estudos clínicos:

- A) Inibidores da monoaminoxidase.
- B) Benzodiazepínicos.
- C) Inibidores da receptação de noradrenalina.
- D) Inibidores seletivos da recaptção da serotonina.

### Questão 19

Com relação ao Haloperidol, qual alternativa abaixo não corresponde a sua característica farmacológica e clínica:

- A) Baixo potencial quinidínico (risco arritmogênico).
- B) Bloqueio altamente seletivo dos receptores tipo2 da dopamina.
- C) Baixa repercussão clínico-sistêmica.
- D) Grande efeito bloqueador alfa1 adrenérgico.

### Questão 20

Faça a correlação entre os transtornos e suas caraterísticas clínicas.

1. Transtorno de estresse pós-traumático.
2. Transtorno de pânico.
3. Ansiedade secundária a uma condição médica geral.
4. Transtorno de ansiedade generalizada.

- A. Cursa com anormalidades no metabolismo cerebral do lactato.
- B. Aborrecimentos relacionados ao grau de preocupações por mais de seis meses.
- C. Redução da influência parassimpática na resposta psicofisiológica.
- D. Tensão interna de início agudo com atitude perplexa.

A correlação correta é:

- A) 1-C; 2-A; 3-D; 4-B.
- B) 1-C; 2-B; 3-A; 4-D.
- C) 1-D; 2-A; 3-B; 4-C.
- D) 1-B; 2-C; 3-A; 4-D.

## CARGO DE MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL

### Questão 21

Com base no texto abaixo, assinale a alternativa que corresponde à hipótese diagnóstica:

"P.D.S- homem, 71 anos, com quadro de início agudo de labilidade afetiva, desinibição sexual, heteroagressividade, e alterações cognitivas diurnas. Iniciou tratamento com agentes anti-Alzheimer, paciente evoluiu com intensificação da sintomatologia. Introduziu-se Valproato de sódio e após duas semanas apresenta resposta clínica satisfatória."

- A) Psicose cicloide.
- B) Estágio inicial de demência vascular.
- C) Pseudodemência maniforme.
- D) Convulsão parcial complexa.

### Questão 21

Considerando os vários tipos de memória, qual é a constituída pela combinação de habilidades de atenção e de memória imediata e que permite manter e manipular informações novas:

- A) Memória de procedimentos.
- B) Memória semântica.
- C) Memória implícita.
- D) Memória de trabalho.

### Questão 23

Assinale a alternativa que a medicação utilizada no tratamento do *delirium* causado por uso de anticolinérgicos.

- A) Tiamina.
- B) Fisostigmina.
- C) Tioridazida.
- D) Tacrina.

### Questão 24

Em mulheres, os sinais da doença esquizofrenia são mais comuns aos 30 anos de idade, é raro encontrar casos de esquizofrenia de início acima da idade de:

- A) 35 anos.
- B) 40 anos.
- C) 45 anos.
- D) 55 anos.

### Questão 25

Os homens costumam apresentar sintomas de esquizofrenia entre os:

- A) 10 e 15 anos.
- B) 20 e 25 anos.
- C) 25 e 30 anos.
- D) 30 e 35 anos.

## CARGO DE MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM SAÚDE MENTAL

### Questão 26

A Síndrome de dependência do álcool é uma doença caracterizada pelos seguintes elementos:

- I- Compulsão: uma necessidade forte ou desejo incontrolável de beber.
- II- Perda de controle: a incapacidade frequente de parar de beber uma vez que a pessoa já começou.
- III- Dependência física: a ocorrência de sintomas de abstinência, como náuseas, suor, tremores e ansiedade, quando se para de beber após um período bebendo muito. Tais sintomas são aliviados bebendo álcool ou tomando droga sedativa.
- IV- Tolerância: a necessidade de aumentar as quantias de álcool para sentir-se 'Alto'.

A alternativa correta é:

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas III.
- D) Todas as afirmativas.

### Questão 27

Assinale qual alternativa corresponde ao antídoto para intoxicação por meperidina:

- A) Naloxone.
- B) Bicarbonato de sódio.
- C) Atropina.
- D) Flumazenil.

### Questão 28

Sobre a eletroconvulsoterapia (ECT) é correto afirmar:

- A) A ECT é eficaz no tratamento da depressão resistente aos antidepressivos, mas não no controle rápido dos sintomas da catatonia e na desordem maníaca severa prolongada.
- B) A ECT está associada a baixas taxas de recaídas seguidas de remissão da depressão, motivo pelo qual se suspende a farmacoterapia com antidepressivos por um período de 16 a 20 semanas após a remissão da doença.
- C) Os efeitos adversos sobre a memória não acontecem mais, tendo em vista as técnicas atuais de utilização do método.
- D) Tem como algumas indicações: depressão com alto risco de suicídio, de ferir os outros ou a si próprio e de negligência e deterioração física.

### Questão 29

Diante das diversas alterações no processo de pensar, assinale a alternativa que contém uma alteração do conteúdo do pensamento:

- A) Desagregação no pensamento.
- B) Fuga de ideias.
- C) Persecutório.
- D) Roubo de pensamento.

Questão 30

Faça a correlação entre os diversos tipos de alucinações e suas características:

- 1) Alucinações funcionais.
  - 2) Alucinações autoscópica.
  - 3) Alucinações extracampinas.
  - 4) Alucinações cenestésicas.
- A) Desencadeadas por estímulos sensoriais.  
B) São experimentadas fora do campo sensoperceptivo usual.  
C) "Fenômeno do duplo".  
D) Sensações anormais em partes do corpo.

A alternativa correta é:

- A) 1-A; 2-B; 3-C; 4-D.
- B) 1-A; 2-C; 3-B; 4-D.
- C) 1-D; 2-C; 3-B; 4-A.
- D) 1-D; 2-B; 3-C; 4-A.